

Potilastiedot ja hoitopäiväkirja

Sinulle, jonka hoidossa käytetään
OPDIVO®-valmistetta (nivolumabi) yhdessä
YERVOY®-valmisteen (ipilimumabi)
kanssa malignin pleuramesoteliooman
(keuhkopussisyöpä) hoitoon



Johdanto

Tämä esite on tarkoitettu ohjeeksi sinulle, jonka hoidossa käytetään OPDIVO-valmistetta yhdessä YERVOY-valmisteen kanssa. Esite sisältää lisätietoa OPDIVO- ja YERVOY-valmisteista ja siitä, mitä voit odottaa hoidoltasi. Tässä esitteessä kuvaillaan myös mahdollisten sivuvaikutusten oireet, joita sinun tulee tarkkailla, sekä mitä sinun tulee tehdä, jos havaitset näitä oireita.

Katso kattavat tiedot OPDIVO- ja YERVOY-valmisteiden pakkausselosteesta osoitteesta www.fass.se.

Tietoa hoidosta

Immuunijärjestelmä koostuu useista erilaisista soluista, kuten T-soluista, jotka ovat osa kehon luonnollista puolustusjärjestelmää. T-solut etsivät ja tuhoavat kehon vieraina pitämiä soluja, kuten bakteereja, viruksia ja syöpäsoluja. Joskus syöpäsolut voivat kuitenkin onnistua piiloutumaan immuunijärjestelmän puolustukselta, jolloin syöpä pääsee kasvamaan ja leviämään.

OPDIVO auttaa pysäyttämällä syöpäsolujen immuunijärjestelmän T-soluille asettaman sulun. YERVOY puolestaan lisää T-solujen aktiivisuutta niin, että ne voivat hyökätä syöpäsoluja vastaan ja tuhota ne.

Koska hoito aktivoi immuunijärjestelmää, sen aikana voi ilmetä sivuvaikutuksia, jotka aiheutuvat siitä, että immuunijärjestelmästä tulee hyvin aktiivinen ja se alkaa hyökätä terveitä soluja vastaan. Sinun on tärkeä ottaa heti yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai sairaanhoitajaan, jos havaitset oireita tai merkkejä sivuvaikutuksista. Lisätietoa hoitoon liittyvistä sivuvaikutuksista voit lukea kohdasta Hoidon sivuvaikutukset sivuilta 3–4.

Ennen hoidon aloittamista

Ennen hoitoa lääkärisi tarkistaa yleisen terveydentiläsi. Sinulta otetaan myös verikokeita hoidon aikana.

Ennen hoitoa käyttä lääkärisi kanssa läpi seuraavat:

- onko sinulla autoimmuunisairaus (tila, jossa keho hyökkää kehon omia soluja vastaan)
- oletko aikaisemmin saanut OPDIVO- tai YERVOY-valmistetta ja saanut vakavia sivuvaikutuksia näistä lääkeaineista
- onko syöpä levinnyt aivoihin
- onko sinulla aikaisemmin ollut tulehdus keuhkoissa
- käytätkö tai oletko äskettäin käyttänyt muita lääkeaineita.


Keskustele lääkärisi kanssa, jos olet tai uskot olevasi raskaana, jos suunnittelet lapsen hankintaa tai jos imetät. Hoidon yhteydessä on tärkeä suojautua raskaudelta.

Hoidon toteuttaminen

OPDIVO yhdessä YERVOY-valmisteen kanssa

OPDIVO ja YERVOY annetaan infuusiona (tiputuksessa) vereen. Infuusiota annetaan 30 minuutin ajan kumpaakin ja hoitojen välissä pidetään vähintään 30 minuutin tauko.

Hoito koostuu OPDIVO-valmisteesta kolmen viikon välein yhdessä YERVOY-valmisteen kanssa seitsemän viikon välein.



Hoitopäivänä saatat tuntea olosi sairaaksi. Hoitava lääkärisi tai sairaanhoitajasi kertoo, miten voit hoitaa näitä oireita. YERVOY-valmisteen määrä lasketaan kehon painon mukaan. Kerro hoitohenkilökunnalle, jos painosi nousee tai laskee.

Hoitosi jatkuu enintään kahden vuoden ajan tai kunnes sen sietokyky heikkenee. Lääkärisi arvioi hoidon keston esimerkiksi röntgenin avulla.

Jos et pääse hoitoon varattuna aikana

On erittäin tärkeää, että tulet hoidettavaksi varattuina aikoina. Jos et pääse varattuun hoitoon, lääkärisi suunnittelee seuraavan annoksen antoajan.

Hoidon sivuvaikutukset

Kaikkien lääkeaineiden tavoin myös nämä voivat aiheuttaa sivuvaikutuksia, mutta niitä ei välttämättä tule kaikille. Hoito vaikuttaa immuunijärjestelmääsi ja voi aiheuttaa tulehdusta kehon eri osiin. Tulehdus voi aiheuttaa vakavia vaurioita kehoon, ja tietyt tulehdustilat voivat olla hengenvaarallisia ja niihin voidaan tarvita hoitoa tai ne voivat edellyttää hoidon keskeyttämistä.

Valtaosaan hoitoon liittyvistä sivuvaikutuksista voidaan vaikuttaa. Lääkärisi voi esimerkiksi päättää antaa sinulle toista lääkeainetta oireiden vähentämiseksi ja komplikaatioiden estämiseksi, siirtää seuraavaa annosta myöhemmäksi tai lopettaa hoidon. Varhaiset sivuvaikutuksia ehkäisevät toimenpiteet vähentävät sen riskiä, että hoito täytyy keskeyttää. Sinun on tärkeä ottaa heti yhteyttä hoitohenkilökuntaan, jos epäilet sivuvaikutusta tai et voi hyvin.

Sivuvaikutuksia voi ilmetä koska tahansa hoidon aikana. Ota huomioon, että sivuvaikutuksia voi tulla jopa viikkojen tai kuukausien kuluttua viimeisimmästä annoksesta.

Sinun on tärkeä ottaa heti yhteyttä hoitohenkilökuntaan, jos epäilet sivuvaikutusta. Sivuvaikutukset on erittäin tärkeä havaita ajoissa, sillä silloin ne voidaan hoitaa ja tilan paheneminen voidaan estää.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai sairaanhoitajaan, jos havaitset joitakin näistä merkeistä tai oireista:



Maksaan liittyvät ongelmat: merkkejä ja oireita tästä voivat olla keltaisen silmänvalkuaiset tai kellertävä iho (keltatauti), kipu vatsanseudun vasemmalla puolella tai väsymys.



Ripuli: vetinen, löysä tai pehmeä uloste tai muut suolen tulehduksen (koliitti) oireet, kuten vatsakivut ja limainen tai verinen uloste.



Munuaisiin liittyvät ongelmat: merkki ja oire tästä voi olla virtsan määrän väheneminen.



Keuhkoihin liittyvät ongelmat, kuten hengitysvaikeudet tai yskä. Nämä voivat olla merkkejä tulehduksesta keuhkoissa.



Tulehdus lihaksissa, kuten myokardiitti (sydänlihastulehdus), myosiitti (lihastulehdus) ja rabdomyolyyysi (lihasten ja nivelten jäykkyys, lihaskrampit). Tämän merkit ja oireet voivat ilmetä lihaskipuna, jäykkyytenä, heikkoutena, rintakipuna tai voimakkaana väsymyksenä.



Hormonia tuottaviin rauhasiin liittyvät ongelmat (kilpirauhanen tai lisämunuaiset): merkkejä ja oireita siitä, että rauhaset eivät toimi normaalisti, voivat olla voimakas väsymys, painon muutokset tai päänsärky ja näköhäiriöt.



Diabetes (oireet, kuten kohtuuton jano, virtsan määrän voimakas lisääntyminen, ruokahalun lisääntyminen ja painon lasku, väsymyksen tunne, uneliaisuus, heikkous, masennus, ärsyntyneisyys) tai diabeettinen ketoasidoosi (diabetekseen liittyvä happi veressä).



Ihotulehdus, joka voi aiheuttaa vakavan ihoreaktion (tunnetaan nimellä toksinen epidermaalinen nekrolyysi ja Stevens-Johnsonin oireyhtymä). Merkkejä ja oireita vakavasta (joskus hengenvaarallisesta) ihoreaktiosta voivat olla ihottuma, kutina ja ihon hilseileminen.

Ota välittömästi yhteyttä sairaanhoitohenkilökuntaan, jos havaitset tässä esitteessä mainittuja merkkejä tai oireita tai jos sinulla on muita sivuvaikutuksia. Lääkehoito varhaisessa vaiheessa voi estää ongelman pahenemisen. Älä yritä hoitaa oireita muilla lääkkeillä itse.

Katso kattava luettelo sivuvaikutuksista OPDIVO- ja YERVOY-valmisteiden pakkausselosteesta osoitteesta **www.fass.se**.

Yleisimpiä hoitoon liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

OPDIVO yhdessä YERVOY-valmisteen kanssa on lääkeaine, joka auttaa kehon omaa puolustusjärjestelmää hyökkäämään syöpäsoluja vastaan ja tuhoamaan niitä.

Miten OPDIVO yhdessä YERVOY-valmisteen kanssa toimii?

Immuunijärjestelmä koostuu useista erilaisista soluista, kuten T-soluista, jotka ovat osa kehon luonnollista puolustusjärjestelmää. T-solut etsivät ja tuhoavat kehon vieraina pitämiä soluja, kuten bakteereja, viruksia ja syöpäsoluja. Joskus syöpäsolut voivat kuitenkin onnistua piiloutumaan immuunijärjestelmän puolustukselta, jolloin syöpä pääsee kasvamaan ja leviämään.

OPDIVO auttaa pysäyttämällä syöpäsolujen immuunijärjestelmän T-soluille asettaman sulun. YERVOY puolestaan lisää T-solujen aktiivisuutta niin, että ne voivat hyökätä syöpäsoluja vastaan ja tuhota ne. Lääkärisi arvioi, voidaanko sinua hoitaa OPDIVO- ja YERVOY-valmisteiden yhdistelmällä.

Koska hoito aktivoi immuunijärjestelmää, sen aikana voi ilmetä sivuvaikutuksia, jotka aiheutuvat siitä, että immuunijärjestelmästä tulee hyvin aktiivinen ja se alkaa hyökätä terveitä soluja vastaan. Sinun on tärkeä ottaa heti yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai sairaanhoitajaan, jos havaitset oireita tai merkkejä sivuvaikutuksista. Lisätietoa hoitoon liittyvistä sivuvaikutuksista voit lukea kohdasta Hoidon sivuvaikutukset sivuilta 3–4.

Miten hoito annetaan?

OPDIVO ja YERVOY annetaan infuusiona (tiputuksessa) vereen. Infuusiota annetaan 30 minuutin ajan kumpaakin ja hoitojen välissä pidetään vähintään 30 minuutin tauko.

Hoito koostuu OPDIVO-valmisteesta kolmen viikon välein yhdessä YERVOY-valmisteen kanssa seitsemän viikon välein.

Missä hoito annetaan?

Hoito tapahtuu sairaalassa lääkärin valvonnassa.

Miten kauan hoito jatkuu?

Hoitosi jatkuu enintään kahden vuoden ajan tai kunnes sen sietokyky heikkenee. Lääkärisi arvioi hoidon keston esimerkiksi röntgenin avulla.

Täytyykö hoito lopettaa, jos sivuvaikutuksia ilmenee?

Jos havaitset sivuvaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriin tai sairaanhoitajaan. Valtaosaan hoitoon liittyvistä sivuvaikutuksista voidaan vaikuttaa. Lääkärisi voi päättää antaa sinulle toista lääkeainetta oireiden vähentämiseksi ja sivuvaikutusten pahenemisen estämiseksi, siirtää seuraavaa annosta myöhemmäksi tai lopettaa hoidon. Varhaiset sivuvaikutuksia ehkäisevät toimenpiteet vähentävät sen riskiä, että hoito täytyy keskeyttää.

Mitä teen, jos havaitsen sivuvaikutuksia hoidon aikana?

On tärkeää, että otat heti yhteyttä lääkäriin tai sairaanhoitajaan, jotta sivuvaikutuksia voidaan hoitaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niiden pahenemisen estämiseksi. OPDIVO- ja YERVOY-valmisteiden käytön sivuvaikutukset saadaan usein poistettua kortikosteroideilla.

Sinun on tärkeä ottaa heti yhteyttä hoitohenkilökuntaan, jos epäilet sivuvaikutusta tai et voi hyvin. Älä yritä hoitaa oireita tai sivuvaikutuksia itse. On myös tärkeä tietää, että sivuvaikutuksia voi ilmetä koska tahansa hoidon aikana ja jopa useita kuukausia hoidon päättymisen jälkeen.

Voinko käyttää muita lääkkeitä hoidon aikana?

On tärkeää, että kerrot lääkärillesi kaikista muista käyttämistäsi lääkkeistä ennen hoidon aloittamista. Hoidon aikana on myös tärkeää, että keskustelet lääkärisi kanssa ennen uuden lääkkeen käytön aloittamista.

Mitä teen, jos en pääse hoitoon varattuna aikana?

On erittäin tärkeää, että käyt jokaisella hoitokerralla. Jos et pääse varattuun hoitoon, hoitoyksikkösi suunnittelee seuraavan annoksen antoajan.

Jos sinulla on muuta kysyttävää hoidostasi, ota yhteyttä lääkäriin tai sairaanhoitajaan.

Potilaskorttisi

Saat potilaskortin lääkäriltä tai sairaanhoitajalta. Se sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, jotka sinun on tärkeä huomioida ennen OPDIVO- ja YERVOY-valmisteilla tehtävää hoitoa sekä hoidon aikana ja sen jälkeen. Se sisältää myös tietoja, jotka kaikkien sinua hoitavien henkilöiden tulee tietää hoidostasi. Tästä syystä on tärkeää, että näytät potilaskortin aina kaikille sinua hoitaville henkilöille. Tämä koskee myös käyntejä terveyskeskuksessa tai sairaalassa.

Jos et ole saanut potilaskorttia tai jos olet kadottanut sen, pyydä uusi kortti sinua hoitavalta lääkäriltä tai sairaanhoitajalta.

Pidä potilaskortti aina mukanasasi ja näytä se, jos käyt toisella lääkärillä esimerkiksi lomalla ollessasi. Se sisältää tärkeää tietoa oireista, joita voi olla tarpeen hoitaa sinua hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Hoitopäiväkirja

Tämän päiväkirjan tarkoituksena on auttaa sekä sinua, lääkäriäsi että sairaanhoitajaasi havaitsemaan varhaisessa vaiheessa mahdolliset sivuvaikutusten oireet, joita voi ilmetä, kun sinua hoidetaan OPDIVO- ja YERVOY-valmisteilla. Kun oireet havaitaan varhaisessa vaiheessa, niitä voidaan usein hoitaa ja sivuvaikutusten paheneminen voidaan estää.

Täytä päiväkirjaa ja ota se mukaasi jokaiselle käynnille hoitavan lääkärin tai sairaanhoitajan luona.

1. HOITOVIIKKO

Hoidon päivämäärä: päivä/.....

..... päivä/.....	 päivä/.....	 päivä/.....	 päivä/.....	 päivä/.....	 päivä/.....	 päivä/.....
Kuinka voit?						
Selviydytkö päivittäisistä toiminnoistasi?						
Onko sinulla pahoinvointia ja/tai oksenteletko?						
☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI
Oletko menettänyt ruokahalusi tai onko sinulla normaalia vähemmän nälän tunnetta?						
☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI
Kuinka monta kertaa ulostat päivässä?						
Ulostatko normaalia useammin?						
☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI
Ovatko ulosteesi ohuita tai vetisiä?						
☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI
Oletko nähnyt verta tai limaa ulosteissasi?						
☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI
Onko ulostaminen kivuliasta?						
☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI
Onko sinulla tuore yskä tai onko yskäsi pahentunut?						
☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI
Onko sinulla hengitysvaikeuksia?						
☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI
Onko sinulla kutinaa, ihottumaa, mustelmia, haavaumia tai ihon kuoriutumista?						
☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI
Onko sinulla jatkuvaa tai epätavallista päänsärkyä?						
☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI
Oletko ollut erittäin väsynyt?						
☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI
Onko sinulla ollut mielialan tai käyttäytymisen muutoksia, kuten seksuaalivietin heikentymistä, ärtyneisyyttä tai unohtelemista?						
☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI
Onko sinulla ollut lihasten puutumista, kipua tai heikkoutta tai kävelemisvaikeuksia?						
☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI
Onko sinulla kipua tai tunnottomuutta/ turvotusta nivelissä tai lihaksissa?						
☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI
Onko sinulla ollut kipua tai silmän punoitusta, näkökyvyn ongelmia tai näön hämärtymistä?						
☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI	☐ KYLLÄ ☐ EI

Ota välittömästi yhteyttä poliklinikkaan, jos tunnet olosi sairaaksi hoidon aikana. Siellä voidaan auttaa sinua.

Katso kattavat tiedot OPDIVO- ja YERVOY-valmisteiden pakkausselosteesta osoitteesta www.fass.se.

Lisätietoa OPDIVO- ja YERVOY-valmisteista on sivustossa www.opdivopatient.se

OPDIVO® on immuunihoito, jota käytetään aikuisten hoitoon, joilla on

- edennyt ei-pienisoluisen keuhkosyöpä (keuhkosyövän tyyppi)
- keuhkopussisyöpä (maligni pleuramesotelioma, syöpätyyppi, joka vaikuttaa keuhkoja ympäröivään kudokseen).

Opdivo-valmisteen vaikuttava aine on nivolumabi.

Opdivoa voidaan antaa monoterapiana tai yhdessä Yervoy®-valmisteen ja kemoterapian kanssa pitkälle edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon.

Opdivoa voidaan antaa Yervoy-valmisteen kanssa keuhkopussisyövän hoitoon.

On tärkeää, että luet myös yhdessä Opdivon kanssa saamasi lääkeaineen pakkausseloste. Jos sinulla on kysyttävää näistä lääkeaineista, ota yhteyttä lääkäriisi.

Älä käytä Opdivoa, jos olet allerginen nivolumabille tai jollekin muulle tämän lääkeaineen sisältämälle aineelle.

Älä hoida Opdivon käyttöön liittyviä sivuvaikutuksia itse, vaan ota aina yhteyttä lääkäriisi. Ota huomioon, että sivuvaikutuksia voi ilmetä koska

tahansa hoidon aikana, joskus jopa viikkojen tai kuukausien päästä viimeisimmästä annoksesta.

Vahvuus ja pakkaus: Opdivo on infuusionestetiiviste, jonka vahvuus on 10 mg/ml. Pakkauskoko on joko 1 injektioipullo à 4 ml, 1 injektioipullo à 10 ml tai 1 injektioipullo à 24 ml.

Lisätietoja: Lisätietoja Opdivosta saat lukemalla huolellisesti pakkauksessa olevan pakkausselosteen (on myös osoitteessa www.fass.se).

Bristol Myers Squibb
Puh.: +46 8 704 7100
www.bms.com/se
Versio 10

YERVOY® on immuunihoito, jota käytetään aikuisilla ja vähintään 12-vuotiailla nuorilla edenneen melanooman (ihosyöpätyyppi) hoitoon. Yervoy-valmistetta voidaan antaa yhdessä Opdivo®-valmisteen kanssa aikuisille edenneen melanooman, edenneen munuaissolusyövän tai keuhkopussisyövän (maligni pleuramesotelioma, keuhkosyöpätyyppi, joka vaikuttaa keuhkoja ympäröivään kudokseen) tai edenneen kolorektaalisyövän (paksusuoli- tai peräsuolisyöpä) hoitoon. Yervoy-valmistetta voidaan antaa aikuisille Opdivo-valmisteen ja kemoterapian

kanssa edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon. On tärkeää, että luet myös Opdivo-valmisteen pakkausselosteen. Jos sinulla on kysyttävää Opdivo-valmisteesta, ota yhteyttä lääkäriisi.

Yervoy-valmisteen vaikuttava aine on ipilimumabi.

Älä käytä Yervoy-valmistetta, jos olet allerginen ipilimumabille tai jollekin muulle tämän lääkeaineen sisältämälle aineelle.

Älä hoida Yervoy-valmisteen käyttöön liittyviä sivuvaikutuksia itse, vaan ota aina yhteyttä lääkäriisi. Ota huomioon, että sivuvaikutuksia voi ilmetä koska tahansa hoidon aikana, joskus jopa viikkojen tai kuukausien päästä viimeisimmästä annoksesta.

Vahvuus ja pakkaus: Yervoy on infuusionestetiiviste, jonka vahvuus on 5 mg/ml. Pakkauskoko on joko 1 injektioipullo à 10 ml tai 1 injektioipullo à 40 ml.

Lisätietoja: Lisätietoja Yervoysta saat lukemalla huolellisesti pakkauksessa olevan pakkausselosteen (on myös osoitteessa www.fass.se).

Bristol Myers Squibb
Puh.: +46 8 704 7100
www.bms.com/se
Versio 4