


Patientkort

▼ Opdualag är föremål för utökad övervakning för att snabbt kunna identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera eventuella biverkningar till din läkare.



Detta patientkort är en del av godkännandet för försäljning.
©2023 Bristol Myers Squibb Company. All rights reserved.









Information till dig som får behandling med Opdualag

Ha alltid med dig detta kort för att kunna informera hälso- och sjukvårdspersonal som du kommer i kontakt med i samband med behandling (till exempel läkare, sjuksköterska, apotekspersonal, akutvårdspersonal).



VIKTIGT

Opdualag kan orsaka allvarliga immunrelaterade biverkningar som kan påverka olika delar av kroppen. Dessa biverkningar kan uppkomma när som helst under behandlingen och kan även uppkomma veckor eller månader efter sista dosen av behandlingen. Vissa av följande biverkningarna kan vara livshotande och måste behandlas omedelbart:

Del av kroppen	Möjliga biverkningar
 Lungor	Ny eller förvärrad hosta, andfåddhet, andningssvårigheter eller bröstsmärta.
 Mage och tarm	Diarré (vattnig, lös eller mjuk avföring) eller ökad avföringsfrekvens. Avföring som är svart, tjärliknande, klabbig eller innehåller blod eller slem. Smärta eller ömhet i magen.
 Lever	Gulfärgad hud eller ögonvitor (gulsot), illamående eller kräkningar, smärta på höger sida av magen, mörkfärgad urin, trötthet, blöder eller får blåmärken lättare än vanligt.
 Endokrina (hormonutsöndrande) körtlar (inklusive diabetes och diabetisk ketoacidosis)	Huvudvärk, ökad svettning, viktuppgång eller viktnedgång, ökad trötthet, ökad aptit eller törst, behöver urinera oftare, håravfall, frossa, förstoppning, röstförändringar, yrsel eller svimning, förändringar av humör eller beteende, ljuskänslighet, ögonbesvär, snabba hjärtslag, svårt att tänka klart, fruktig eller sötaktig andedräkt, söt eller metallisk smak i munnen, urin eller svett luktar annorlunda än vanligt, illamående eller kräkning, magsmärtor, djup eller snabb andning.
 Njurar	Minskad mängd urin, svullna vristar, aptitförlust, blod i urinen.
 Hud	Hudutslag, klåda, blåsor eller fjällande hud, smärtande sår i munnen.
 Hjärta	Ny eller förvärrad bröstsmärta, oregelbundna och/eller snabba hjärtslag, trötthet, svullna anklar, andfåddhet.
 Allmänt/övrigt	Förvirring, sömnhet, minnesproblem, nackstelhet, balansproblem, stickningar eller domningar i armar eller ben, dubbelseende, ögonsmärta, synförändringar, ihållande eller svår muskelsmärta eller muskelsvaghet, muskelkramper, svullna lymfkörtlar.



Om du upplever något av symtomen ovan, eller symptom som inte går över eller förvärras ska du **omedelbart** tala om det för din läkare eller sjuksköterska eller söka annan medicinsk vård.

Immunrelaterade biverkningar kan även förekomma i andra organ och vävnader. Alla tecken och symptom på problem i samband med behandlingen med Opdualag finns inte med i patientkortet. Rådgör alltid med läkare och/eller sjuksköterska om du får biverkningar, även sådana som inte finns med på kortet eller i bipacksedeln.



MER INFORMATION

- Berätta för din läkare om sjukdomar du har eller har haft och om tidigare eller pågående behandlingar. Det gäller bland annat om du har fått eller planerar att få en stamcellstransplantation med donatorstamceller (allogen stamcellstransplantation) eller har fått ett organtransplantat.
- För att Opdualag ska kunna användas säkert är det viktigt att biverkningar identifieras och behandlas snabbt. Tecken och symptom som verkar lindriga kan snabbt förvärras om de inte behandlas.
- Försök **INTE** behandla eventuella symptom på egen hand. Det är väldigt viktigt att du kontaktar och rådgör med din läkare eller sjuksköterska.
- Om du får biverkningar kan du behöva andra läkemedel för att lindra symtomen eller förhindra att de förvärras. Det kan också hända att din läkare behöver senarelägga eller helt stoppa behandlingen med Opdualag om du får allvarliga biverkningar.
- För mer information, läs bipacksedeln till Opdualag på www.fass.se eller ring Bristol Myers Squibbs Medicinsk Information på tel. 08-585 07 304.



VIKTIG information för hälso- och sjukvårdspersonal

- Denna patient behandlas med Opdualag, ett läkemedel som kan orsaka allvarliga immunrelaterade biverkningar som kan påverka olika organsystem och vara livshotande.
- Immunrelaterade biverkningar kan uppträda när som helst under behandlingen. De kan vara fördröjda och komma veckor eller månader efter att behandlingen har avslutats.
- Tidig diagnos och lämplig behandling av immunrelaterade biverkningar är avgörande för att minimera livshotande komplikationer.
- Att konsultera en specialist kan vara till hjälp vid hantering av organspecifika allvarliga immunrelaterade biverkningar.
- Hälso- och sjukvårdspersonal hittar mer information i produktresumén för Opdualag på www.fass.se eller ring Bristol Myers Squibbs Medicinsk Information på 08-585 07 304 för mer information.

Kontaktuppgifter till min läkare (som förskrivit Opdualag)

Fyll i med VERSALER.

Läkarens namn: _____

Telefonnummer arbete: _____

Telefonnummer efter kontorstid: _____

Mina kontaktuppgifter

Fyll i med VERSALER.

Mitt namn: _____

Mitt telefonnummer: _____

Kontaktinformation vid en nödsituation:

Namn: _____

Telefonnummer: _____