

معلومات المريض ومفكرة العلاج

للمرضى الذين يُعالجون بعقار **OPDIVO**[®]
(نيفولوماب) مع عقار **YERVOY**[®] (إيبيليموماب)
والعلاج الكيميائي لسرطان الرئة ذي الخلايا
غير الصغيرة



هذا الكتيب مُخصَّص كدليل للمرضى الذين يعالجون بعقار OPDIVO مع YERVOY ودورتي علاج بالعلاج الكيميائي القائم على البلاتين. ستتعرف هنا على المزيد حول OPDIVO و YERVOY وما يمكنك توقعه مع علاجك. يرد في هذا الكتيب وصف لأعراض الآثار الجانبية المحتملة، والتي يجب أن تنتبه إليها كما تجد في هذا الكتيب الأمور التي عليك فعلها إذا ظهرت عليك هذه الأعراض.

للحصول على معلومات كاملة، يُرجى الإطلاع على نشرة عبوة دوائي OPDIVO و YERVOY على الموقع www.fass.se.

لا يتضمن هذا الكتيب معلومات خاصة عن العلاج الكيميائي. لذلك من المهم أن ترجع إلى نشرات العبوة لهذه الأدوية. اسأل طبيبك إذا كانت لديك أسئلة حول العلاج الكيميائي الخاص بك، أو اقرأ المعلومات الواردة في نشرة العبوة الخاصة بهذه الأدوية على الموقع www.fass.se.

عن العلاج

يتكون جهاز المناعة من العديد من الخلايا المختلفة، منها الخلايا التائية، والتي هي جزء من الجهاز الطبيعي للدفاع عن الجسم. تبحث الخلايا التائية عن خلايا يعتبرها الجسم أجساماً غريبة وتدمرها، مثل البكتيريا والفيروسات والخلايا السرطانية. أحياناً تستطيع الخلايا السرطانية أن تجد طريقة للتخفي عن جهاز المناعة المدافع عن الجسم مما يمكن السرطان من النمو والانتشار.

يساعد العقار OPDIVO عن طريق وقفه لآلية حصر الخلايا السرطانية من التقدم نحو الخلايا التائية بجهاز المناعة. أما دواء YERVOY فيعمل بطريقة مختلفة حيث يزيد من نشاط الخلايا التائية حتى تستطيع أن تهاجم الخلايا السرطانية وتدمرها.

بما أن هذا العلاج يحقق فعاليته بتنشيط جهاز المناعة، فقد تنتج عنه آثار جانبية نتيجة أن جهاز المناعة يصبح مفرط النشاط ويبدأ بمهاجمة الخلايا السليمة. من المهم الاتصال بطبيبك المعالج أو الممرضة مبكراً في حال تعرضك لأعراض أو علامات تدل على وجود آثار جانبية. يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات عن الآثار الجانبية المرتبطة بالعلاج في قسم "الآثار الجانبية للعلاج" في الصفحتين 3-4.

قبل بدء العلاج

قبل العلاج، سوف يُجري طبيبك فحصاً للتحقق من حالة صحتك العامة. سوف تعطي أيضاً عينات دم خلال علاجك.

قبل العلاج، سوف تتباحث مع طبيبك حول ما إذا:

- كنت تعاني من مرض مناعة ذاتية (حالة يهاجم فيها الجسم خلاياه الخاصة)
- كنت قد تلقيت OPDIVO أو YERVOY من قبل وعانيت من آثار جانبية خطيرة من هذه الأدوية
- كان سرطانك قد انتشر إلى المخ
- كنت قد عانيت من التهاب في الرئتين
- كنت تتناول أدوية أخرى أو تناولت أدوية أخرى مؤخراً

أبلغني طبيبك إذا ما كنت حاملاً أو تعتقدين أنك حامل أو إذا كنتِ تعترمين إنجاب طفل أو إذا كنتِ تمارسين الرضاعة الطبيعية. من الأهمية بمكان أن تحمي نفسك من الحمل أثناء العلاج.


طريقة تناول العلاج

دواء OPDIVO بالتراffic مع YERVOY والعلاج الكيميائي

سيتم إعطاء دواء OPDIVO و YERVOY والعلاج الكيميائي لك عبر التسريب (التنقيط) في الدم يتم إعطاء التسريبات على مدار 30 دقيقة لكل واحد مع 30 دقيقة على الأقل من الراحة بين العلاجات. يعتمد وقت العلاج بالعلاج الكيميائي على العلاج الكيميائي الذي يتم تلقيه.

في جلسة العلاج الأولى، يتم إعطاء OPDIVO متبوعاً بعقار YERVOY ثم العلاج الكيميائي. بعد ثلاثة أسابيع، يتم إعطاء OPDIVO متبوعاً بالجرعة الأخيرة من العلاج الكيميائي.

بعد هذه المرحلة، يتم إعطاء OPDIVO كل ثلاثة أسابيع و YERVOY كل ستة أسابيع. هذا يعني أنه يتم إعطاء العلاج بـ OPDIVO و YERVOY كل ستة أسابيع، بينما تشمل دورة العلاج بينهما العلاج بـ OPDIVO فقط.



في اليوم الذي تتناول فيه العلاج، قد تعاني إحساساً عاماً بالمرض. يمكن لطبيبك المعالج وممرضتك أن يخبراك في هذه الحالة بكيفية علاج هذا. ستحدد كمية YERVOY استناداً إلى وزن جسمك. عليك أن تُعلم طبيبك في حال زاد وزنك أو انخفض.

سوف يستمر طبيبك في إعطائك علاجك لمدة تصل إلى عامين أو حتى تتوقف عن تحمله. سيقوم طبيبك بتقييم العلاج، على سبيل المثال عن طريق فحص الأشعة السينية.

إذا تغيبت عن موعد جلسة علاج

من المهم جداً حضورك لمواعيد تلقي جلسات العلاج. إذا تغيبت عن جلسة علاج، فعندها سيقرر طبيبك موعد إعطائك الجرعة التالية.

الآثار الجانبية للعلاج

كسائر الأدوية، قد تسبب هذه الأدوية آثاراً جانبية ولكن ليس بالضرورة أن يصاب بها الجميع. يؤثر علاجك على جهازك المناعي وقد يتسبب بالتهابات في بعض أجزاء الجسم. وقد يسبب الالتهاب إصابة خطيرة في الجسم وقد تكون بعض الحالات الالتهابية مهددة للحياة وقد تحتاج للعلاج أو قد يتطلب الأمر وقفك للعلاج.

يمكن التغلب على الغالبية العظمى من الآثار الجانبية المرتبطة بعلاجك. على سبيل المثال، قد يقرر طبيبك أن تتناول أدوية أخرى للحد من الأعراض ومنع المضاعفات، أو تأجيل موعد الجرعة التالية إلى تاريخ آخر أو إيقاف العلاج. اتخاذ تدابير مبكرة للتغلب على الآثار الجانبية يقلل من خطورة الاضطراب لإيقاف العلاج. من المهم أن تتصل مبكرًا بطبيبك أو ممرضتك إذا كان لديك شك بوجود آثار جانبية أو شعرت بعدم ارتياح.

قد تحدث الآثار الجانبية في أي وقت خلال العلاج. عليك التنبه لأن الآثار الجانبية قد تحدث أيضًا بعد أسابيع أو أشهر بعد تناول آخر جرعة.

من المهم أن تتصل بطبيبك أو ممرضتك إن كان لديك شك بوجود أحد الآثار الجانبية. من المهم جدًا اكتشاف الآثار الجانبية مبكرًا لإتاحة فرصة للعلاج ومن ثم الوقاية من تدهور وضعك الصحي.

اتصل على الفور بطبيبك أو بالمرضة

إذا ظهرت عليك أي من هذه العلامات أو الأعراض:

مشكلات بالكبد: قد تكون العلامات والأعراض اصفرار بياض العينين أو اصفرار الجلد (يرقان) أو ألم بالجزء الأيمن من المعدة أو تعب.



إسهال: براز مائي أو رخو أو لين أو غير ذلك من أعراض التهاب الأمعاء (التهاب القولون)، مثل ألم في المعدة ومخاط أو دم بالبراز.



مشكلات بالكلى: قد تكون العلامات والأعراض انخفاض كمية البول.



مشكلات بالرئتين: مثل صعوبات في التنفس أو سعال. قد تكون هذه علامة على التهاب الرئتين.



التهاب في العضلات: مثل التهاب عضلة القلب والتهاب العضلات وانحلال الريبيدات (تصلب العضلات والمفاصل، تشنج العضلات). وقد تظهر علامات وأعراض من ذلك على صورة آلام في العضلات أو تصلب أو ضعف أو ألم بالصدر أو تعب شديد.



مشكلات في الغدد المنتجة للهرمونات (بما في ذلك الغدة الدرقية والغدة الكظرية): قد تكون العلامات والأعراض التي بوجودها لا تعمل الغدد بشكل طبيعي هي التعب الشديد أو تغيرات في الوزن أو صداع واضطرابات بصرية.



داء السكري (أعراض كالعطش الشديد، ارتفاع كبير بكمية البول، زيادة الشهية مع فقدان الوزن، إحساس بالإرهاق، نعاس، وهن، اكتئاب، حدة المزاج، والإحساس العام بالمرض) أو الحمض الكيتوني السكري (حمض في الدم ناجم عن مرض السكري).



التهاب الجلد والذي يمكن أن يسبب تحسس جلدي خطير (يُعرف باسم تقشر الأنسجة المتوترة البشرية التسممي ومتلازمة ستيفنس-جونسون). وقد تظهر علامات وأعراض تحسس جلدي خطير (أحيانًا قاتل) على هيئة طفح وحكة وانفصال الجلد.



اتصل فورًا بموظفي الرعاية الطبية إذا لاحظت علامات أو أعراض ذكرت في هذا الكتيب، أو إذا احساست بآثار جانبية أخرى. تلقي العلاج الطبي في مرحلة مبكرة قد يحد من تفاقم المشكلة كي لا تصبح جسيمة. لا تحاول علاج الأعراض التي تعاني منها باستخدام أدوية أخرى من تلقاء نفسك.

للحصول على لائحة كاملة بالآثار الجانبية، يُرجى الإطلاع على نشرة عبوة دوائي OPDIVO و YERVOY على الموقع الإلكتروني www.fass.se

أسئلة شائعة وأجوبة حول علاجك

OPDIVO بالترافق مع YERVOY هي أدوية تساعد جهاز مناعة الجسم في مهاجمة الخلايا السرطانية وتدميرها.

كيف هو أداء OPDIVO بالترافق مع YERVOY؟

يتكون جهاز المناعة من العديد من الخلايا المختلفة، منها الخلايا التائية، والتي هي جزء من الجهاز الطبيعي للدفاع عن الجسم. تبحث الخلايا التائية عن خلايا يعتبرها الجسم أجساماً غريبة وتدمرها، مثل البكتيريا والفيروسات والخلايا السرطانية. ومع هذا، تستطيع الخلايا السرطانية أحياناً أن تجد طريقة لتخفي بها عن جهاز الدفاع بالجسم مما يمكن السرطان من النمو والانتشار.

يساعد العقار OPDIVO عن طريق وقفه لآلية حصر الخلايا السرطانية من التقدم نحو الخلايا التائية بجهاز المناعة. أما دواء YERVOY فيعمل بطريقة مختلفة حيث يزيد من نشاط الخلايا التائية حتى تستطيع أن تهاجم الخلايا السرطانية وتدمرها. سيحدد طبيبك ما إذا كنت ستتلقى العلاج المكون من OPDIVO و YERVOY.

بما أن هذا العلاج يحقق فعاليته بتنشيط جهاز المناعة، فقد تنتج عنه آثار جانبية نتيجة أن جهاز المناعة يصبح مفرط النشاط ويبدأ بمهاجمة الخلايا السليمة. من المهم الاتصال مبكراً بطبيبك المعالج أو الممرضة في حال شعورك بأعراض أو علامات تدل على آثار جانبية. يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات عن الآثار الجانبية المرتبطة بالعلاج في قسم "الآثار الجانبية للعلاج" في الصفحتين 3-4.

كيف سيتم إعطائي العلاج؟

سيتم إعطاء دواء OPDIVO و YERVOY والعلاج الكيميائي لك عبر التسريب (التنقيط) في الدم. يتم إعطاء التسريبات على مدار 30 دقيقة لكل واحد مع 30 دقيقة على الأقل من الراحة بين العلاجات. يعتمد وقت العلاج بالعلاج الكيميائي على العلاج الكيميائي الذي يتم تلقيه.

في جلسة العلاج الأولى، يتم إعطاء OPDIVO متبوعاً بعقار YERVOY ثم العلاج الكيميائي. بعد ثلاثة أسابيع، يتم إعطاء OPDIVO متبوعاً بالجرعة الأخيرة من العلاج الكيميائي.

بعد هذه المرحلة، يتم إعطاء OPDIVO كل ثلاثة أسابيع و YERVOY كل ستة أسابيع. يعني هذا أنه يتم إعطاء العلاج بـ OPDIVO و YERVOY كل ستة أسابيع، بينما تشمل دورة العلاج بينهما العلاج بـ OPDIVO فقط.

أين سأحصل على العلاج؟

سيتم إعطاؤك العلاج في المستشفى تحت إشراف طبيبك.

كم سيستمر علاجي؟

سوف يستمر طبيبك في إعطائك علاجك لمدة تصل إلى عامين أو حتى تتوقف عن تحمله. سيقوم طبيبك بتقييم العلاج، على سبيل المثال عن طريق فحص الأشعة السينية.

هل يجب إيقاف العلاج إذا تعرضت لآثار جانبية؟

إذا شعرت بآثار جانبية، فيجب أن تتصل بطبيبك أو الممرضة. يمكن علاج الغالبية العظمى من الآثار الجانبية المتعلقة بعلاجك. قد يقرر طبيبك إعطاؤك أدوية أخرى للحد من الأعراض ومنع المضاعفات، أو يقرر إعطاؤك الجرعة التالية في تاريخ لاحق، أو يقرر إيقاف العلاج. اتخاذ تدابير مبكرة للتغلب على الآثار الجانبية يقلل من خطورة الاضطراب لإيقاف العلاج.

كيف علي أن أتصرف في حال شعرت بآثار جانبية أثناء العلاج؟

من المهم أن تتصل فوراً بطبيبك أو الممرضة حتى يستطيعوا معالجة الآثار الجانبية في أقرب وقت والحد من تفاقمها. من الممكن عادةً تخفيف الآثار الجانبية الناجمة عن العلاج بالعقار OPDIVO و YERVOY بتناول كورتيكوستيرويدات.

من المهم أن تتصل مبكراً بطبيبك أو ممرضتك إذا كان لديك شك بوجود آثار جانبية أو شعرت بعدم ارتياح. لا تحاول علاج الأعراض أو الآثار الجانبية من تلقاء نفسك. من المهم أيضاً معرفة أن الآثار الجانبية قد تحدث في أي وقت أثناء علاجك وحتى أيضاً عدة أشهر بعد انتهائك من العلاج.

هل أستطيع تناول أدوية أخرى أثناء علاجي؟

من المهم إبلاغ طبيبك بكل الأدوية الأخرى التي تتناولها قبل بدءك للعلاج، وفي أثناء العلاج، من المهم أيضاً أن تستشير طبيبك قبل أن تبدأ في تناول أي دواء آخر.

ما الذي ينبغي أن أفعله إذا تغييت عن موعد جلسة علاج؟

من المهم جداً أن تلتزم بجميع جلسات العلاج. في حال تغييت عن أحد جلسات العلاج، سترتب الوحدة المسؤولة عن علاجك موعد إعطائك الجرعة التالية.

إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى حول علاجك، فاتصل بطبيبك أو ممرضتك.

بطاقة المريض المخصصة لك

سوف تحصل على بطاقة المريض من طبيبك أو ممرضتك. تحتوي البطاقة على معلومات السلامة المهمة التي يلزمك معرفتها قبل فترة العلاج بعقار OPDIVO و YERVOY وخلالها وبعدها. كما تحتوي على المعلومات التي يجب على جميع الفريق الطبي معرفتها عن علاجك. ولذلك من المهم أن تبرز بطاقة المريض إلى كافة العاملين الآخرين في الرعاية الصحية الذين تقابلهم. ينطبق هذا أيضاً عند زيارة مركز رعاية أولية أو مستشفى.

في حال لم تحصل على بطاقة مريض بعد أو إذا فقدتها، فاطلب واحدة جديدة من طبيبك المعالج أو الممرضة.

أحضر معك بطاقة المريض دائماً وأظهرها إذا احتجت لزيارة طبيب آخر، على سبيل المثال إذا كنت في عطلة. كما أنها تحتوي على معلومات مهمة عن الأعراض التي قد تحتاج إلى علاج بالتشاور مع طبيبك المعالج.

مفكرة علاجك

الغرض من هذه المفكرة هو التسهيل عليك وعلى طبيبك وممرضتك واكتشاف أعراض الآثار الجانبية مبكراً التي قد تحدث عند علاجك بالعقار OPDIVO و YERVOY. إذا تم اكتشاف الأعراض في وقت مبكر فهذا يمكن غالباً من علاجها والحد من تفاقم الآثار الجانبية.

خذ وقتك ملء المفكرة وإحضارها عند كل زيارة تقوم بها لطبيبك المعالج أو الممرضة.

تاريخ العلاج اليوم، ال /

اليوم	اليوم	اليوم	اليوم	اليوم	اليوم	اليوم		
..... / / / / / / /		
كيف حالك؟								
هل ما زلت قادرًا على القيام بأنشطتك المعتادة؟								
هل تعاني من الغثيان و/أو القيء؟								
<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	
هل تفتقد شهيتك للطعام أو شعورك بالجوع أقل من المعتاد؟								
<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	
كم عدد مرات تغوطك في كل يوم؟								
هل عدد مرات تغوطك أكثر من المعتاد؟								
<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	
هل البراز رقيق أو مائي؟								
<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	
هل يوجد دم أو مخاط بالبراز؟								
<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	
هل تعاني من ألم عند التغوط؟								
<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	
هل أصبت بسعال جديد أو تفاقم السعال؟								
<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	
هل لديك مشكلات بالتنفس؟								
<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	
هل أصبت بحكة أو طفح جلدي أو بثور أو تقرحات أو تقشر بالجلد؟								
<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	
هل تعاني من صداع دائم أو غير معتاد؟								
<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	
هل شعرت بالتعب الشديد؟								
<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	
هل عانيت من تغيرات في المزاج أو السلوك مثل نقص في الرغبة الجنسية، حدة المزاج (الانفعالية) أو النسيان؟								
<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	
هل عانيت من تنميل أو ألم أو ضعف بالعضلات أو صعوبة في المشي؟								
<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	
هل تشعر بالألم أو خدر/تورم في المفاصل أو العضلات؟								
<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	
هل شعرت بالألم أو احمرار بالعين أو مشكلات بالرؤية أو ضبابية بالرؤية؟								
<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	

اتصل فورًا بالعيادة الخارجية حيث تحصل على العلاج إذا شعرت بمرض أثناء العلاج كي يساعدوك.

لمزيد من المعلومات حول OPDIVO أو OPDIVO مع YERVOY ، تفضّل زيارة الموقع الإلكتروني www.opdivopatient.se

الكيميائي لسرطان الرئة غير صغير الخلايا المتقدم لدى البالغين. من المهم أيضاً أن تقرأ نشرة عبوة OPDIVO. استفسر من طبيبك إذا كانت لديك أسئلة حول OPDIVO.

المادة الفعالة في YERVOY هي مادة اسمها إيبيليموماب.

لا تستخدم YERVOY إذا كنت تعاني من حساسية تجاه نيفولوماب أو أي من السواغات الأخرى الموجودة بهذا الدواء.

يجب ألا تعالج الآثار الجانبية المرتبطة بدواء YERVOY من تلقاء نفسك. اتصل دائماً بطبيبك. انتبه إلى أن الآثار الجانبية قد تحدث في أي وقت أثناء العلاج وأحياناً بعد تناول آخر جرعة بأسابيع أو شهور.

التركيز والعبوة: YERVOY هو تركيز 5 ملغ/مل لحلول للتعريب. حجم العبوة إما زجاجة حقن واحدة تحتوي على 10 مل، أو زجاجة حقن واحدة تحتوي على 40 مل.

المزيد من المعلومات: للحصول على معلومات كاملة حول YERVOY، اقرأ النشرة الموجودة في العبوة

بإمكانك الاطلاع عليها أيضاً على الموقع www.fass.se.

Bristol Myers Squibb

هاتف: 08-7047100

www.bms.com/se

الإصدار 2

بطبيبك. انتبه إلى أن الآثار الجانبية قد تحدث في أي وقت أثناء العلاج وأحياناً بعد تناول آخر جرعة بأسابيع أو شهور.

OPDIVO: قوتوميلاو وريكريتلا هو تركيز 10 ملغ/مل لحلول للتعريب. حجم العبوة إما زجاجة حقن واحدة بحجم 4 مل، أو زجاجة حقن واحدة بحجم 10 مل، أو زجاجة حقن واحدة بحجم 24 مل.

معلومات إضافية: للحصول على معلومات كاملة حول OPDIVO، اقرأ نشرة العبوة الموجودة في العلبة بإيمان (تتوفر أيضاً على الموقع www.fass.se).

Bristol Myers Squibb

هاتف: 00 71 08-704

www.bms.com/se

الإصدار 4

YERVOY هو علاج مناعي يُستخدم لعلاج حالات الميلانوما، أحد أنواع سرطان

الجلد، المتقدمة لدى البالغين والمراهقين ممن لا تقل أعمارهم عن 12 عامًا. قد يُعطى YERVOY بالتزامن مع OPDIVO لعلاج الحالات المتقدمة من الميلانوما أو سرطان خلايا الكلى المتقدم لدى البالغين. يمكن إعطاء YERVOY مع OPDIVO والعلاج

OPDIVO هو علاج مناعي يستخدم لعلاج البالغين الذين يعانون من:

- حالات الميلانوما المتقدمة (نوع من سرطان الجلد)
- الميلانوما التي تم استئصالها بجراحة (يسمى العلاج بعد الجراحة بالعلاج المساعد)
- سرطان الرئة المتقدم غير صغير الخلايا (نوع من سرطان الرئة)
- سرطان الخلايا الكلوية المتقدم
- سرطان الغدد الليمفاوية هودجكينز
- سرطان الرأس والعنق المتقدم
- سرطان خلايا الظهارة البولية المتقدم (سرطان في المثانة والمسالك البولية)
- سرطان المريء المتقدم

المادة الفعالة في OPDIVO هي نيفولوماب. قد يُعطى OPDIVO بالتزامن مع YERVOY لعلاج الحالات المتقدمة من الميلانوما أو سرطان خلايا الكلى المتقدم. يمكن إعطاء OPDIVO مع YERVOY والعلاج الكيميائي لسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة المتقدم. من المهم أيضاً أن تقرأ نشرة عبوة YERVOY. استفسر من طبيبك إذا كانت لديك أسئلة حول YERVOY.

OPDIVO لا تستخدم إذا كنت تعاني من حساسية تجاه نيفولوماب أو أي من السواغات الأخرى الموجودة بهذا الدواء.

يجب ألا تعالج الآثار الضارة المرتبطة بدواء OPDIVO من تلقاء نفسك. اتصل دائماً

