

# Din guide till YERVOY™ (ipilimumab) Patientbroschyr

Denna guide är utformad för att hjälpa dig att identifiera alla typer av biverkningar som kan uppstå under din behandling med YERVOY.

Om du har blivit ordinerad enbart YERVOY, för behandling av avancerat melanom (en typ av hudcancer) hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre

→ *Läs denna patientbroschyr och YERVOY™ (ipilimumab) Patientkort.*

Om du har blivit ordinerad YERVOY i kombination med OPDIVO® (nivolumab)

→ *Läs istället OPDIVO® (nivolumab) Patientkort.*

**Denna patientbroschyr finns även som interaktiv webbsida:**

**<http://pwa.ltd/yervoy-pat-SE>**

- YERVOY kan orsaka allvarliga biverkningar i olika delar av kroppen som omedelbart måste behandlas, oberoende av allvarlighetsgrad, för att undvika att de förvärras.
- Symtom kan inkludera diarré, gulfärgning av hud och ögonvitor, hudutslag med eller utan klåda, dimsyn, ögonsmärta, muskelsvaghet, domningar eller stickningar i ben, armar eller ansikte eller huvudvärk.
- Innan du får behandling, informera din läkare om ditt fullständiga sjukdomstillstånd och andra mediciner du tar eller nyligen har tagit.
- Ring din läkare omedelbart om du utvecklar något av de symtom som nämns i denna broschyr, eller andra symtom, eller om symtomen håller i sig eller blir värre.
- Bär alltid med dig Patientkortet och visa det för alla läkare du träffar.
- Ytterligare information om YERVOY finns i bipacksedeln.

Rapportera eventuella biverkningar till din läkare.



## Introduktion

Denna guide inkluderar ett Patientkort. Bär alltid med dig Patientkortet och visa det för alla läkare du träffar (till exempel om din vanliga läkare inte är tillgänglig eller om du är ute och reser).

Patientkortet påminner dig om viktiga symptom som omedelbart måste rapporteras till läkare/sjuksköterska. Det innehåller också kontaktuppgifter till din behandlande läkare och kommer göra andra läkare medvetna om att du behandlas med YERVOY.



### Kontakta din läkare på detta nummer

Läkarens namn: .....

Telefonnummer: .....

Sjuksköterskans namn: .....

Telefonnummer: .....

## Viktiga biverkningar som kan uppstå av behandlingen

Det är viktigt att du meddelar din läkare omedelbart om du har, eller utvecklar, någon av de biverkningar som listas här nedanför.

**Tidig behandling av biverkningar minskar risken för att YERVOY-behandlingen tillfälligt eller permanent måste stoppas och möjliggör istället att du kan få ut maximal effekt av behandlingen.**

Meddela också din läkare om biverkningarna förvärras, även om de inte verkar allvarliga eller om du är osäker på om det är en biverkning.<sup>1</sup>

Om biverkningar uppstår sker det oftast under de 12 första veckorna av behandlingen. Dock kan biverkningar vara fördröjda och utvecklas veckor eller månader efter sista behandlingsdosen. Du behöver därför vara uppmärksam på biverkningar även efter att din behandling avslutats.<sup>1</sup>

#### MAGE OCH TARM<sup>1</sup>

- diarré (vattnig, lös eller mjuk avföring), blodig eller mörkfärgad avföring
- fler tarmtömningar än vanligt
- smärta eller ömhet i magen eller buken, illamående, kräkningar

#### LEVER<sup>1</sup>

- guldfärgade ögon eller hud (gulsot)
- smärta på höger sida i magtrakten
- mörk urin

#### HUD<sup>1</sup>

- hudutslag med eller utan klåda, torr hud
- blåsor och/eller flagnande hud, munsår
- svullnad i ansiktet eller lymfkörtlarna

#### ÖGON<sup>1</sup>

- rödögd
- ögonsmärta
- synproblem eller dimsyn

#### NERVER<sup>1</sup>

- muskelsvaghet
- domningar eller stickningar i ben, armar eller ansikte
- yrsel, svimning eller svårigheter att vakna

#### ÖVRIGT<sup>1</sup>

- feber, huvudvärk, trötthet
- blödningar
- beteendeförändringar (t.ex. minskad sexuell lust, irritation eller glömska)

- Försök inte under några omständigheter att behandla dessa symptom själv. Sök medicinsk hjälp så snart som möjligt.
- Bär alltid med dig Patientkortet och visa upp för alla läkare du träffar (till exempel om din vanliga läkare inte är tillgänglig eller om du är ute och reser).

# Vad du kan vänta dig i samband med din behandling

---

## Före behandlingen kontrollerar din läkare:

- om du tar kortikosteroider eller annan behandling som påverkar immunsystemet
- om du tar några läkemedel som hindrar blodet från att levera sig (antikoagulerande medel)
- din leverfunktion
- din sköldkörtelfunktion
- om du har en autoimmun sjukdom (ett tillstånd där kroppen angriper sina egna celler)
- om du har eller har haft en kronisk virusinfektion i levern, inklusive:
  - hepatit B (HBV)
  - hepatit C (HCV)
- om du har en infektion med humant immunbristvirus (HIV) eller förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)
- ditt allmäntillstånd för att kunna avgöra om du är lämplig för behandlingen

*Tala om för din läkare om du är gravid, ammar eller planerar att bli gravid.<sup>1</sup>*

## 1. Bipacksedeln för YERVOY

---

## Var du kan hitta mer information

För mer information:

- Se bipacksedeln för YERVOY som medföljer förpackningen eller på [www.fass.se](http://www.fass.se) och [www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu)
- Ring Medicinsk Information på Bristol-Myers Squibb 08-585 07 304.
- Denna patientbroschyr finns även som interaktiv webbsida: <http://pwa.ltd/yervoy-pat-SE>