

OPDIVO® (nivolumab)

Patientkort

▼ Opdivo är föremål för utökad övervakning för att snabbt kunna identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera eventuella biverkningar till din läkare.



Bristol-Myers Squibb

OPDIVO® (nivolumab)

Detta kort innehåller viktig information.

Bär alltid med dig detta kort för att kunna informera sjukvårdspersonal att du får behandling med Opdivo eller Opdivo i kombination med Yervoy.

Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av dessa eller några andra symtom

LUNGOR¹

andningssvårigheter, hosta

MAGE OCH TARM¹

diarré (vattnig, mjuk eller lös avföring), blod eller slem i avföringen, mörkfärgad avföring, smärta eller ömhet i mage eller buk

LEVER¹

gulvärgade ögon eller hud (gulst), smärta på höger sida av magtrakten, trötthet

NJURAR¹

minskad urinmängd

DIABETES/DIABETISK KETOACIDOS¹

överdriven törst, ökad aptit med vikt förlust, trötthet, svaghet, dåsighet, depression, irritation, allmän sjukdomskänsla, ökad urinmängd

HUD¹

hudreaktioner som hudutslag med eller utan klåda, blåsor och/eller hudfjällning (potentiellt livshotande), sår, torr hud, hudknutor

HORMONPRODUCERANDE KÖRTLAR¹

huvudvärk, dimsyn eller dubbelseende, utmattning, extrem trötthet, vikt förändring, beteendeförändringar (t.ex. minskad sexlust, irritation eller glömska)

HJÄRTA¹

bröstmärta, oregelbunden hjärtrytm, hjärtklappning

MUSKLER¹

muskelsmärta, stelhet, svaghet, förvirring, minskad urinmängd, mörk urin, uttalad trötthet

ÖVRIGT¹

smärta eller rodnad i ögat, dimsyn eller andra synproblem; smärta i övre delen av buken, minskad aptit, illamående eller kräkning; matsmältningsbesvär eller halsbränna; stickningar eller domningar i armar och ben eller svårigheter att gå, feber, svullna lymfkörtlar, tecken eller symtom på inflammation i hjärnan, som kan inkludera huvudvärk, feber, kramp-anfall, nackstelhet, trötthet, förvirring, svaghet eller dåsighet

! VIKTIGT

- Tidig hantering av biverkningar, av din läkare, minskar risken för att behandlingen med Opdivo (nivolumab) eller Opdivo i kombination med Yervoy (ipilimumab) måste stoppas tillfälligt eller permanent.
- Symtom som tycks vara milda kan snabbt förvärras om de inte behandlas.¹
- Försök inte att behandla dessa symtom på egen hand.
- Rapportera dessa eller andra symtom till din läkare direkt.
- Tecken och symtom kan ibland uppträda sent, det vill säga veckor eller månader efter din sista dos.¹
- Bär detta kort med dig för att informera sjukvårdspersonal att du behandlas med Opdivo (nivolumab) eller Opdivo i kombination med Yervoy (ipilimumab).

INNAN DU BÖRJAR BEHANDLING MED OPDIVO, BERÄTTA FÖR DIN LÄKARE OM DU:

- vet att du är allergisk mot Opdivo (nivolumab), något annat läkemedel eller beståndsdel i ett läkemedel.
- har en autoimmun sjukdom.
- har melanom i ögat.
- har fått biverkningar vid behandling med ett annat läkemedel, t.ex. Yervoy (ipilimumab).
- har fått veta att cancer har spridit sig till hjärnan.
- har tagit läkemedel som dämpar ditt immunförsvar.
- har transplanterats (Opdivo kan orsaka avstötning av transplanterade organ t.ex. njure, lever, hjärta, hornhinnan eller hud).
- har fått ett benmärgs- eller stamcellstransplantat från en annan person (allogen)
- tidigare har haft någon inflammation i lungorna.
- är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.
- tar eller har tagit andra läkemedel.
- står på en saltfattig kost.

För mer information, se Opdivo bipacksedel som medföljer förpackningen samt finns på fass.se och www.ema.europa.eu eller ring Medicinsk Information på telnr: 08-585 07 304

Kontaktuppgifter till min läkare

Läkarens namn:

.....
.....

Telefonnummer arbete:

.....
.....

Telefonnummer efter kontorstid:

.....
.....

Mina kontaktuppgifter

Mitt namn och telefonnummer:

.....
.....

Kontaktinformation vid en nödsituation:

.....
.....



VIKTIG Information för sjukvårdspersonal

- Denna patient behandlas med **Opdivo (nivolumab)** eller **Opdivo i kombination med Yervoy (ipilimumab)**.
- Immunrelaterade biverkningar kan uppträda när som helst under behandlingen eller månader efter avslutad behandling.
- Tidig diagnos och lämplig behandling är avgörande för att minimera livshotande komplikationer. En Opdivo-specifik förskrivarguide för immunrelaterade biverkningar finns tillgängligt.
- Att konsultera en specialist inom onkologi, hematologi eller lungmedicin kan vara till hjälp vid hantering av organspecifika immunrelaterade biverkningar.

För mer information för sjukvårdspersonal, vänligen se OPDIVO® produktresumé (SmPC) på fass.se och www.ema.europa.eu, länk till förskrivarguide och patientkort finns på Opdivo.se eller ring Bristol-Myers Squibb Medicinsk Information på telefonnummer: **08-585 07 304**

1. OPDIVO® bipacksedel.