

**OPDIVO MONOTERAPI  
OPDIVO + YERVOY KOMBINATIONSBEHANDLING**

# DOSERINGSKORT

---



**OPDIVO**<sup>®</sup> + **YERVOY**<sup>®</sup>  
(nivolumab) (ipilimumab)

**OPDIVO**<sup>®</sup>  
(nivolumab)



## MALIGNT MELANOM



MALIGNT  
MELANOM

OPDIVO MONOTERAPI

### BEHANDLINGSINTERVALL VARANNAN ELLER VAR FJÄRDE VECKA

VECKA

0

OPDIVO®  
240 mg 30 min

2

OPDIVO®  
240 mg 30 min

4

OPDIVO®  
240 mg 30 min

6

OPDIVO®  
240 mg 30 min

8

OPDIVO®  
240 mg 30 min

10

OPDIVO®  
240 mg 30 min

12

OPDIVO®  
240 mg 30 min



VECKA

0

OPDIVO®  
480 mg 60 min

2

OPDIVO®  
480 mg 60 min

4

OPDIVO®  
480 mg 60 min

6

OPDIVO®  
480 mg 60 min

8

OPDIVO®  
480 mg 60 min

10

OPDIVO®  
480 mg 60 min

12

OPDIVO®  
480 mg 60 min



Behandlingen fortsätter så länge klinisk nytta ses  
eller tills behandlingen inte längre tolereras

### FAST DOSERING

Dos	Infusionstid	Behandlingsintervall
<b>OPDIVO MONOTERAPI</b>		
240 mg	30 minuter	Varannan vecka
<b>ELLER</b>		
480 mg	60 minuter	Var fjärde vecka

Vid byte från dosering 240 mg varannan vecka till 480 mg var fjärde vecka ska den första dosen på 480 mg ges två veckor efter den sista dosen på 240 mg.

Vid byte från doseringen 480 mg var fjärde vecka till 240 mg varannan vecka ska den första dosen på 240 mg ges fyra veckor efter den sista dosen på 480 mg.

**OPDIVO**  
(nivolumab)




## MALIGNT MELANOM




MALIGNT  
MELANOM

### KOMBINATIONSFAS

VECKA



### BEHANDLINGSINTERVALL VARANNAN ELLER VAR FJÄRDE VECKA



Behandlingen fortsätter så länge klinisk nytta ses  
eller tills behandlingen inte längre tolereras

OPDIVO + YERVOY  
KOMBINATIONSBEHANDLING

### KOMBINATIONSBEHANDLING

Dos	Infusionstid	Behandlingsintervall
<b>STEG 1. KOMBINATIONSBEHANDLING MED YERVOY</b>		
OPDIVO 1 mg/kg följt av YERVOY 3 mg/kg	OPDIVO: 30 minuter YERVOY: 90 minuter	Var tredje vecka de första fyra doserna

### STEG 2. FORTSATT BEHANDLING MED OPDIVO

240 mg	30 minuter	Varannan vecka
<b>ELLER</b>		
480 mg	60 minuter	Var fjärde vecka

Underhållsbehandlingen påbörjas 3 veckor (behandling varannan vecka med 240 mg) respektive 6 veckor (behandling var fjärde vecka med 480 mg) efter kombinationsfasen.

Vid byte från dosering 240 mg varannan vecka till 480 mg var fjärde vecka ska den första dosen på 480 mg ges två veckor efter den sista dosen på 240 mg.

Vid byte från doseringen 480 mg var fjärde vecka till 240 mg varannan vecka ska den första dosen på 240 mg ges fyra veckor efter den sista dosen på 480 mg.

**OPDIVO** + **YERVOY**  
(nivolumab) (ipilimumab)



## ADJUVANT MELANOM



MALIGNT  
MELANOM

OPDIVO MONOTERAPI

### FAST DOSERING

Dos	Infusionstid	Behandlingsintervall
OPDIVO MONOTERAPI		
3 mg/kg	60 minuter	Varannan vecka

VECKA

0

OPDIVO®  
3 mg/kg 60 min

2

OPDIVO®  
3 mg/kg 60 min

4

OPDIVO®  
3 mg/kg 60 min

6

OPDIVO®  
3 mg/kg 60 min

8

OPDIVO®  
3 mg/kg 60 min

10

OPDIVO®  
3 mg/kg 60 min

12

OPDIVO®  
3 mg/kg 60 min



Vid adjuvant behandling är den maximala  
behandlingstiden 12 månader.

**OPDIVO**  
(nivolumab)



## LUNGCANCER

OPDIVO MONOTERAPI

### FAST DOSERING

Dos	Infusionstid	Behandlingsintervall
OPDIVO MONOTERAPI		
240 mg	30 minuter	Varannan vecka



LUNGCANCER

VECKA

0

OPDIVO®  
240 mg 30 min

2

OPDIVO®  
240 mg 30 min

4

OPDIVO®  
240 mg 30 min

6

OPDIVO®  
240 mg 30 min

8

OPDIVO®  
240 mg 30 min

10

OPDIVO®  
240 mg 30 min

12

OPDIVO®  
240 mg 30 min

Behandlingen fortsätter så länge klinisk nytta ses  
eller tills behandlingen inte längre tolereras


**OPDIVO**  
(nivolumab)




## FÖRSTA LINJENS BEHANDLING AV NJURCELLSCANCER

### KOMBINATIONSFAS

VECKA



### BEHANDLINGSINTERVALL VARANNAN ELLER VAR FJÄRDE VECKA



Behandlingen fortsätter så länge klinisk nytta ses eller tills behandlingen inte längre tolereras

OPDIVO + YERVOY  
KOMBINATIONSBESKÄNING

### KOMBINATIONSBESKÄNING

Dos	Infusionstid	Behandlingsintervall
<b>STEG 1. KOMBINATIONSBESKÄNING MED YERVOY</b>		
OPDIVO 3 mg/kg följt av YERVOY 1 mg/kg	OPDIVO: 30 minuter YERVOY: 30 minuter	Var tredje vecka de första fyra doserna

### STEG 2. FORTSATT BEHANDLING MED OPDIVO

240 mg	30 minuter	Varannan vecka
<b>ELLER</b>		
480 mg	60 minuter	Var fjärde vecka

Underhållsbehandlingen påbörjas 3 veckor (behandling varannan vecka med 240 mg) respektive 6 veckor (behandling var fjärde vecka med 480 mg) efter kombinationsfasen.

Vid byte från dosering 240 mg varannan vecka till 480 mg var fjärde vecka ska den första dosen på 480 mg ges två veckor efter den sista dosen på 240 mg.

Vid byte från doseringen 480 mg var fjärde vecka till 240 mg varannan vecka ska den första dosen på 240 mg ges fyra veckor efter den sista dosen på 480 mg.



NJURCELLS-  
CANCER

**OPDIVO** + **YERVOY**  
(nivolumab) (ipilimumab)



## ANDRA LINJENS BEHANDLING AV NJURCELLSCANCER

OPDIVO MONOTERAPI

### BEHANDLINGSINTERVALL VARANNAN ELLER VAR FJÄRDE VECKA

VECKA

0

OPDIVO®  
240 mg 30 min

2

OPDIVO®  
240 mg 30 min

4

OPDIVO®  
240 mg 30 min

6

OPDIVO®  
240 mg 30 min

8

OPDIVO®  
240 mg 30 min

10

OPDIVO®  
240 mg 30 min

12

OPDIVO®  
240 mg 30 min



VECKA

0

OPDIVO®  
480 mg 60 min

2

4

OPDIVO®  
480 mg 60 min

6

8

OPDIVO®  
480 mg 60 min

10

12

OPDIVO®  
480 mg 60 min



Behandlingen fortsätter så länge klinisk nytta ses  
eller tills behandlingen inte längre tolereras

### FAST DOSERING

Dos	Infusionstid	Behandlingsintervall
<b>OPDIVO MONOTERAPI</b>		
240 mg	30 minuter	Varannan vecka
<b>ELLER</b>		
480 mg	60 minuter	Var fjärde vecka

Vid byte från dosering 240 mg varannan vecka till 480 mg var fjärde vecka ska den första dosen på 480 mg ges två veckor efter den sista dosen på 240 mg.

Vid byte från doseringen 480 mg var fjärde vecka till 240 mg varannan vecka ska den första dosen på 240 mg ges fyra veckor efter den sista dosen på 480 mg.



NJURCELLS-  
CANCER

**OPDIVO**  
(nivolumab)



## KLASSISKT HODGKINS LYMFOM

OPDIVO MONOTERAPI

### FAST DOSERING

Dos	Infusionstid	Behandlingsintervall
OPDIVO MONOTERAPI		
240 mg	30 minuter	Varannan vecka

VECKA

0

OPDIVO®  
240 mg 30 min

2

OPDIVO®  
240 mg 30 min

4

OPDIVO®  
240 mg 30 min

6

OPDIVO®  
240 mg 30 min

8

OPDIVO®  
240 mg 30 min

10

OPDIVO®  
240 mg 30 min

12

OPDIVO®  
240 mg 30 min

Behandlingen fortsätter så länge klinisk nytta ses  
eller tills behandlingen inte längre tolereras



KLASSISKT  
HODGKINS  
LYMFOM

**OPDIVO**  
(nivolumab)





## HUVUD- OCH HALSCANCER

OPDIVO MONOTERAPI

### FAST DOSERING

Dos	Infusionstid	Behandlingsintervall
OPDIVO MONOTERAPI		
240 mg	30 minuter	Varannan vecka

VECKA

0

OPDIVO®  
240 mg 30 min

2

OPDIVO®  
240 mg 30 min

4

OPDIVO®  
240 mg 30 min

6

OPDIVO®  
240 mg 30 min

8

OPDIVO®  
240 mg 30 min

10

OPDIVO®  
240 mg 30 min

12

OPDIVO®  
240 mg 30 min

Behandlingen fortsätter så länge klinisk nytta ses  
eller tills behandlingen inte längre tolereras



HUVUD- OCH  
HALSCANCER

**OPDIVO**  
(nivolumab)



## UROTELCELLSCANCER

OPDIVO MONOTERAPI

### FAST DOSERING

Dos	Infusionstid	Behandlingsintervall
OPDIVO MONOTERAPI		
240 mg	30 minuter	Varannan vecka

VECKA

0

OPDIVO®  
240 mg 30 min

2

OPDIVO®  
240 mg 30 min

4

OPDIVO®  
240 mg 30 min

6

OPDIVO®  
240 mg 30 min

8

OPDIVO®  
240 mg 30 min

10

OPDIVO®  
240 mg 30 min

12

OPDIVO®  
240 mg 30 min

Behandlingen fortsätter så länge klinisk nytta ses  
eller tills behandlingen inte längre tolereras

**OPDIVO**  
(nivolumab)



UROTELCELLS-  
CANCER

# INDIKATIONER



## MELANOM

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab är indicerat för behandling av vuxna med avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande) melanom.

Jämfört med nivolumab monoterapi har en ökning av progressionsfri överlevnad (PFS) och totalöverlevnad (OS) med kombinationen nivolumab och ipilimumab endast visats hos patienter med lågt tumöruttryck av PD-L1.



## ADJUVANT BEHANDLING AV MELANOM

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna efter total resektion av melanom, som involverat lymfkörtlar eller som har metastaserat.



## ICKE-SMÅCELLIG LUNGCANCER (NSCLC)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi.



## FÖRSTA LINJENS BEHANDLING AV NJURCELLSCANCER

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat som första linjens behandling av vuxna med avancerad njurcellscancer med intermediär/dålig prognos.



## ANDRA LINJENS BEHANDLING AV NJURCELLSCANCER

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling.



## KLASSISKT HODGKINS LYMFOM

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximab vedotin.



## SKIVEPITELIAL HUVUD- OCH HALSCANCER (SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av återkommande eller metastaserande skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter platinumbaserad behandling.



## UROTELCELLSCANCER

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer hos vuxna vid otillräcklig effekt av tidigare platinumbaserad behandling.



Bristol-Myers Squibb  
immunonkologi.se

DEC 2018 15065E1807251

**OPDIVO**  
(nivolumab)

**+** **YERVOY**  
(ipilimumab)

**OPDIVO**  
(nivolumab)