

PROGNOSTISKA RISKFAKTORER FÖR NJURCELLSCANCER ENLIGT IMDC*

TID FRÅN DIAGNOS TILL START BEHANDLING <1 ÅR

- *Lågt Karnofsky performance status (<80%)*
- *Lågt hemoglobin (<nedre normalvärde)*
- *Högt korrigerat s-kalcium (>övre normalvärde)*
- *Neutrofiler (>övre normalvärde)*
- *Trombocyter (>övre normalvärde)*

		MEDIANÖVERLEVAD*
LÅG RISK	Inga riskfaktorer	43,2 månader
INTERMEDIÄR RISK	1-2 riskfaktorer	22,5 månader
HÖG RISK	≥ 3 riskfaktorer	7,8 månader

*Anpassat efter Heng DYC, et al. Lancet Oncol. 2013;14:141-148.
IMDC: International Metastatic RCC Database Consortium.*

PROGNOSTISKA RISKFAKTORER FÖR NJURCELLSCANCER ENLIGT MSKCC

MINDRE ÄN ETT ÅR FRÅN DIAGNOS TILL BEHANDLING

- *Lågt Karnofsky performance status (60 eller 70%)*
- *Högt laktatdehydrogenas (>1,5 gånger övre normalvärde)*
- *Lågt serumhemoglobin (<nedre normalvärde)*
- *Högt korrigerat s-kalcium (>2,5 mmol/l)*

GOD PROGNOS Inga riskfaktorer

INTERMEDIÄR PROGNOS 1-2 riskfaktorer

DÅLIG PROGNOS 3 riskfaktorer

*Anpassat efter Njurcancer Nationellt vårdprogram 2017-09-13 Version: 2.
MSKCC: Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC/Motzer).*