

PROGNOSTISKA RISKFAKTORER FÖR NJURCELLSCANCER ENLIGT IMDC*

- Tid från diagnos till start behandling <1 år
- Lågt Karnofsky performance status (<80%)
- Lågt hemoglobin (<nedre normalvärde)
- Högt korrigerat s-kalcium (>övre normalvärde)
- Neutrofiler (>övre normalvärde)
- Trombocyter (>övre normalvärde)

		MEDIANÖVERLEVNAD*
LÅG RISK	Inga riskfaktorer	43,2 månader
INTERMEDIÄR RISK	1-2 riskfaktorer	22,5 månader
HÖG RISK	≥ 3 riskfaktorer	7,8 månader

Anpassat efter Heng DYC, *et al.* Lancet Oncol. 2013;14:141-148.
IMDC: International Metastatic RCC Database Consortium.

PROGNOSTISKA RISKFAKTORER FÖR NJURCELLSCANCER ENLIGT MSKCC

- *Mindre än ett år från diagnos till behandling*
- *Lågt Karnofsky performance status (60 eller 70%)*
- *Högt laktatdehydrogenas (>1,5 gånger övre normalvärde)*
- *Lågt serumhemoglobin (<nedre normalvärde)*
- *Högt korrigerat s-kalcium (>2,5 mmol/l)*

GOD PROG NOS

Inga riskfaktorer

INTERMEDIÄR PROG NOS

1-2 riskfaktorer

DÅLIG PROG NOS

3 riskfaktorer

Anpassat efter Njuncancer Nationellt vårdprogram 2019-06-10 Version: 3.0.
MSKCC: Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC/Motzer).