

Var uppmärksam på biverkningar

I de flesta fall kan biverkningarna behandlas om de upptäcks tidigt, det är **därför viktigt att du kontaktar din läkare eller sjuksköterska omedelbart** om du får något av följande eller andra symtom:



Bröstorg (hjärta och lungor):

andningssvårigheter, hosta, väsande andning, bröstsmärta, oregelbunden hjärtrytm, hjärtklappning (ökad medvetenhet om dina hjärtslag)



Lever: guldfärgade ögon eller hud (gulsot), smärta på höger sida av magtrakten



Njurar: förändring i mängd och/eller frekvens av urin



Mage (magsäck och tarmar):

diarré (vattning, mjuk eller lös avföring), blod eller slem i avföringen, mörkfärgad avföring, smärta eller ömhet i mage eller buk



Hormonproducerande körtlar (inklusive diabetes):

huvudvärk, dimsyn eller dubbelseende, viktförändring, beteendeförändringar (t.ex. minskad sexlust, irritation eller glömska), överdriven törst, ökad aptit med viktörlust, svaghet, dåsigheit, depression, irritation, allmän sjukdomskänsla




Hud: hudutslag med eller utan klåda, blåsor och/eller hudfjällning (potentiellt livshotande), sår, torr hud




Övrigt:

svaghet, extrem trötthet, minskad aptit, illamående, kräkning, stickningar eller domningar i armar och ben, svårigheter att gå, feber, svullna lymfkörtlar, huvudvärk, krampfall, nackstelhet, förvirring, dåsigheit, muskelsmärta, stelhet, mörk urin, smärta eller rodnad i ögat, dimsyn eller andra synproblem

Fullständig information om behandling och biverkningar hittar du i bipacksedeln på www.fass.se.



Du hittar mer information om din behandling med OPDIVO på www.opdivopatient.se. Du kan bli titta på informationsfilmen "Till dig som ska få behandling med immunterapi" där en sjuksköterska berättar om immunförsvaret och hur immunterapi fungerar.



OPDIVO® är en immunterapi som används för att behandla vuxna med:

- framskriden urotelcellscancer (urinblåse- och urinvägscancer)
- urotelcellscancer som fullständigt avlägsnats genom operation

Den verksamma substansen i Opdivo heter nivolumab. Om du får läkemedel i kombination med Opdivo, är det viktigt att du också läser bipacksedeln för dessa. Fråga din läkare om du har frågor om dessa läkemedel.

Använd inte Opdivo om du är allergisk mot nivolumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

Du får inte behandla biverkningar som är relaterade till Opdivo på egen hand utan du måste alltid kontakta din läkare. Observera att biverkningar kan uppkomma när som helst under behandlingen och ibland veckor eller månader efter din sista dos.

Styrka och förpackning: Opdivo är ett koncentrat till infusionsvätska i styrkan 10 mg/ml. Förpackningsstorleken är antingen 1 injektionsflaska à

4 ml, 1 injektionsflaska à 10 ml, 1 injektionsflaska à 12 ml eller 1 injektionsflaska à 24 ml.

Ytterligare information: För fullständig information om Opdivo, läs noga igenom bipacksedeln som medföljer förpackningen (den finns även på www.fass.se).

Bristol Myers Squibb
Tel: 08-7047100
www.bms.com/se
Version 11

 Bristol Myers Squibb™

www.bms.com/se

OPDIVO
(nivolumab)


DEC 2022 1506-SE-2200046

OPDIVO MONOTERAPI



Till dig som ska få
adjuvant behandling med
OPDIVO® (nivolumab)
vid urinblåsecancer

OPDIVO
(nivolumab)

 Bristol Myers Squibb™

Adjuvant behandling med OPDIVO

OPDIVO är en immunterapi som stärker kroppens egna immunförsvar så att det kan angripa cancercellerna.

Adjuvant behandling med OPDIVO ges efter cystektomi (operation av urinblåsan) med syfte att minska risken för att cancersjukdomen ska komma tillbaka. Behandlingen med OPDIVO påbörjas normalt inom 4 månader efter operation och ges vanligtvis under ett år.

OPDIVO kommer att ges till dig som en intravenös infusion (dropp direkt in i blodet). Din läkare kommer bestämma intervallet på behandlingen, men vanligtvis ges droppet var fjärde vecka.

Under behandlingen, och även en period efter behandlingen är avslutad, kommer blodprover att tas och eventuella biverkningar att följas noga. Man kommer också att göra regelbundna röntgenundersökningar under och efter avslutad behandling för att se att din cancersjukdom inte har kommit tillbaka.¹

Eventuella biverkningar

OPDIVO aktiverar ditt immunförsvar och det kan orsaka biverkningar i form av inflammationer i olika organ. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på symtom som kan tyda på inflammation. Alla kommer inte få biverkningar av immunterapin, men hos vissa kan de bli allvarliga. I de flesta fall kan biverkningarna behandlas om de upptäcks tidigt. **Det är därför viktigt att du kontaktar din behandlande läkare eller sjuksköterska omedelbart om du fått något av symtomen på baksidan av den här broschyren.**

Det är inte troligt att OPDIVO påverkar körförmågan eller användningen av maskiner men var försiktig när du utför dessa sysslor tills du är säker på att inte OPDIVO påverkar dig negativt.

Graviditet och fruktsamhet

Det är viktigt att inte bli gravid eller att göra någon gravid när du behandlas med OPDIVO, eftersom läkemedlet kan påverka fostret. Använd därför säkra preventivmedel under behandlingen och minst 5 månader efter sista dosen OPDIVO om du är i fertil ålder. Tala alltid om för din läkare om du skulle bli gravid under behandlingen.

Sexuallivet

Det är normalt att den sexuella lusten minskar både av cancersjukdomen och behandlingen. Den sexuella funktionen för både män och kvinnor kan även påverkas av operationen av urinblåsan. Prata med din läkare eller sjuksköterska om du vill komma i kontakt med sexolog/uroterapeut.

Vaccination

Prata alltid med din läkare eller sjuksköterska om du har frågor kring vaccination.

Hit kan du vända dig för att få stöd:

Patientföreningar

Patientföreningar arbetar ideellt och erbjuder bland annat information, stödsamtal och aktiviteter. Du behöver inte vara medlem för att kontakta en patientförening.

Blåscancerförbundet

✈ www.blascancerforbundet.se

✉ info@blascancerforbundet.se

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

✈ www.ilco.nu

✉ info@ilco.nu

Allmänt stöd vid cancer: Cancerlinjen

✈ www.cancerfonden.se/rad-och-stod/cancerlinjen

☎ 010-199 10 10

Cancerlinjen är Cancerfondens informations- och stödlinje för drabbade och anhöriga. Cancerlinjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.



Vad kan du göra själv?

Om du får symtom enligt baksidan på broschyren är det viktigt att du vänder dig till din behandlande läkare eller sjuksköterska på onkologmottagningen.

Vid urinblåsecancer kan man som patient ha kontakt med många olika vårdinstanser samtidigt. Det är därför viktigt att du vet vem du ska vända dig till vid olika frågor. Det är viktigt att meddela att du har fått immunterapi om du söker vård hos andra vårdgivare.

Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig ett patientkort i fickformat om OPDIVO. Bär alltid kortet med dig och visa upp det om du skulle behöva uppsöka en annan läkare, t.ex. om du är på semester. Det innehåller viktig information om symtom som kan behöva behandlas i samråd med din behandlande läkare på onkologen.

Träning

Det är bra att vara fysiskt aktiv även under en cancerbehandling. Forskning visar att fysisk aktivitet under pågående cancerbehandling kan minska symtom och biverkningar, även göra att man klarar av behandlingen bättre. Din sjuksköterska kan hjälpa dig med olika sorters träningsmetoder som passar just dig, även hjälpa dig med en kontakt med fysioterapeut.

Rökning

Det är tre gånger större risk för rökare att få urinblåsecancer än icke-rökare. Studier har visat att ett rökstopp inför kirurgi halverar risken för komplikationer på både lång och kort sikt.

Råd och stöd

Att få besked att man har drabbats av urinblåsecancer, är för många svårt och omvälvande. Förutom stöd från familj, vänner och vårdpersonal finns idag en rad olika organisationer som arbetar med kunskap och stöd. En cancersjukdom påverkar hela familjen, både känslomässigt och praktiskt. Därför är det viktigt att låta barnen vara delaktiga i det som sker under sjukdomstiden/behandlingstiden.

¹ Nationellt vårdprogram cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör.